

# Supplément

## PROFERT



**Un supplément unique pour les truies offert pendant l'intervalle sevrage-oestrus (ISO). Utiliser Profert pour une meilleure performance de reproduction et plus de porcelets nés vivants.**

Pendant la lactation, les fondations de la portée suivante sont posées. Les follicules, contenant les ovules qui se développent en embryons, grandissent de 1-2 mm à 3-4 mm au moment du sevrage. Dans les 4 à 5 jours après celui-ci, les follicules passent de 3-4 mm à 7-8 mm au moment de l'ovulation. Un apport supplémentaire en nutriments pendant cette période va soutenir cette croissance rapide et augmenter ainsi la fertilité des truies de votre ferme.

### Avantages

- Stimuler la croissance des follicules et des ovocytes
- ISO plus courte avec une période de chaleurs plus intenses
- Moins de retours en chaleur
- Moins d'infections des voies urinaires
- Optimise le développement des follicules
- Plus de porcelets nés vivants
- Moins de porcelets de faible poids à la naissance (meilleure uniformité)
- Retour sur investissement positif


# Supplément

## PROFERT



**Augmentation des nés vivants, amélioration de la viabilité - plus de porcelets sevrés par portée**

### Nombre de porcelets sevrés



### UNIFORMITÉ DE LA PORTÉE


**40 % moins de petits porcelets**



**145g de poids à la naissance**



**VIABILITÉ ACCRUE**



### JOURNÉE DE SEVRAGE

- 1 kg par truie dans la cage de mise bas


### JOUR APRÈS LE SEVRAGE JUSQU'AU JOUR DE L'INSÉMINATION

- 500 grammes par truie, par jour réparti sur 2 repas.

### QUANTITÉ TOTALE

- 3,5-4 kg par cycle.

### Mode d'emploi



Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le représentant Cargill de votre région.